

Denominazione del Medicinale

CISTIDIL

500 mg compresse

30 compresse

COMPOSIZIONE

Ogni compressa contiene:

Principio attivo: Cistina levogira mg 500

Eccipienti: Amido di riso, Lattosio, Polietilenglicol 6000, Carbosimetilamido sale sodico, Magnesio stearato.

FORMA FARMACEUTICA e CONTENUTO

30 compresse per uso orale.

CATEGORIA FARMACOTERAPEUTICA

Aminoacido per trattamento dermatologico.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

IDI FARMACEUTICI s.r.l. - Via dei Castelli Romani 83/85 - Pomezia (RM)

PRODUTTORE E CONTROLLORE FINALE

IDI FARMACEUTICI s.r.l. - Via dei Castelli Romani 83/85 - Pomezia (RM)

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

Coadiuvante nella terapia dell'acne, delle dermatiti atrofiche e della psoriasi.

CONTROINDICAZIONI

Cistinuria con calcolosi renale e ipersensibilità al principio attivo o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

PRECAUZIONI PER L'USO

Alle dosi terapeutiche non ci sono particolari precauzioni per l'uso.

INTERAZIONI

Nessuna nota.

AVVERTENZE SPECIALI

L'uso in gravidanza avviene secondo la prescrizione del medico. La Cistina contenuta nel CISTIDIL non ha effetto teratogeno.

DOSE, MODO E TEMPO DI SOMMINISTRAZIONE

2-4 compresse al giorno durante i pasti per 2 o 3 cicli mensili. Le compresse di CISTIDIL possono essere deglutite intere o spezzate, meglio se durante i pasti, oppure masticate dai soggetti con particolare sensibilità gastrica.

SOVRADOSAGGIO

Non sono mai state riportate sindromi da sovradosaggio.

EFFETTI INDESIDERATI

Ai dosaggi indicati non sono stati riscontrati effetti indesiderati.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riducono il rischio di effetti indesiderati.

Comunicare al proprio medico o al proprio farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglio illustrativo.

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Scadenza: vedi la data di scadenza indicata sulla confezione. Il periodo di validità si intende per il prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

ATTENZIONE: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Conservazione: Conservare a temperatura non superiore ai 25°C.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Revisione del foglio illustrativo da parte del Ministero della Salute: Febbraio 2008

Attraverso il QR Code o all'indirizzo <http://www.leafetidi.it/cistidil> è possibile leggere o ascoltare il presente foglio illustrativo.



IDI FARMACEUTICI S.r.l.
POMEZIA (RM)

MT16RAD519