

CAPSULE



VITAMINA C

**PRIMA DELL'USO
LEGGETE CON ATTENZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI
CONTENUTE NEL FOGLIO ILLUSTRATIVO**

Questo è un medicinale di AUTOMEDICAZIONE che potete usare per curare disturbi lievi e transitori facilmente riconoscibili e risolvibili senza ricorrere all'aiuto del medico. Può essere quindi acquistato senza ricetta ma va usato correttamente per assicurarne l'efficacia e ridurne gli effetti indesiderati.

- per maggiori informazioni e consigli rivolgetevi al farmacista
- consultate il medico se il disturbo non si risolve dopo un breve periodo di trattamento.

DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO: C-TARD 500 mg capsule rigide a rilascio prolungato (Vitamina C)

COMPOSIZIONE

Ogni capsula contiene:

Principio attivo: Acido ascorbico mg 500 in microperline a cessione prolungata.

Eccipienti: saccarosio, gomma lacca, talco, amido, acido tartarico, gelatina, titanio biossido, ossido di ferro giallo, eritrosina, giallo chinolina.

COME SI PRESENTA

C-TARD si presenta in flacone da 60 capsule, contenente cadauna 500 mg di Vitamina C in microperline a cessione prolungata.

CHE COSA È

È un prodotto a base di Vitamina C.

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare S.r.l.

Via Zambelletti s.n.c. - 20021 Baranzate (MI)

PRODUTTORE RESPONSABILE RILASCIO LOTTI

Pfizer Consumer Manufacturing Italy S.r.l. - Aprilia (LT)

PERCHÈ SI USA

C-Tard è indicato nella profilassi e terapia della carenza di Vitamina C (gravidanza, allattamento, alimentazione artificiale dei lattanti, tendenza alle emorragie per fragilità capillare).

Coadiuvante nella terapia delle stomatiti e delle gengiviti.

QUANDO NON DEVE ESSERE USATO

In caso di ipersensibilità verso i componenti.

PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

L'acido ascorbico può interferire, ad alte dosi, sui risultati di alcuni test diagnostici (in particolare la ricerca di glucosio nelle urine con mezzi non specifici).

Il prodotto contiene saccarosio: di ciò si tenga conto in caso di pazienti diabetici e in pazienti che seguono regime ipocalorico.

COME USARE QUESTO MEDICINALE

Una capsula di C-Tard al mattino ed una capsula alla sera.

Non superare le dosi indicate senza il consiglio del medico. Usare solo per brevi periodi di trattamento.

Consultate il medico se il disturbo si presenta ripetutamente o se avete notato un qualsiasi cambiamento recente delle sue caratteristiche.

COSA FARE SE AVETE PRESO UNA DOSE ECCESSIVA DI MEDICINALE

In caso di ingestione/assunzione accidentale di una dose eccessiva di C-Tard avvertite immediatamente il medico o rivolgetevi al più vicino ospedale.

EFFETTI INDESIDERATI

Ai dosaggi più alti di quelli consigliati, sono stati riferiti cefalea e disturbi gastrointestinali.

Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglio illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. Questi effetti indesiderati sono generalmente transitori. Quando si presentano è tuttavia opportuno consultare il medico o il farmacista.

È importante comunicare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel foglio illustrativo. Richiedere e compilare la scheda di segnalazione degli effetti indesiderati disponibile in farmacia (Modello B).

SCADENZA E CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura non superiore a 25°C. Conservare nella confezione originale.

Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

È importante avere sempre a disposizione le informazioni sul medicinale, pertanto conservate sia la scatola che il foglio illustrativo.

TENERE IL MEDICINALE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI

REVISIONE DEL FOGLIO ILLUSTRATIVO DA PARTE DEL MINISTERO DELLA SANITÀ: Febbraio 2021.